Bioline International

JOURNALS

REPORTS

NEWSLETTERS

BOOKS

registration

prices

about

help

Insect Science and its Application

[Search all documents for](#)

Insect Science and its Application, Vol. 22, No. 1, 2002, 61-65

Bioline code: *ti02008*

Price of single document: US\$ 13.00

Influence of Temperature on Age-Specific Fecundity of the Ladybeetle *Micraspis discolor* ^{SP} (Fabricius)

Omkar and Ahmad Pervez

ABSTRACT

The influence of temperature on the age-specific fecundity of an aphidophagous ladybeetle, *Micraspis discolor* ^{SP} (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on the cowpea aphid, *Aphis craccivora* Koch ^{SP} (Homoptera: Aphididae) at four different temperatures, viz. 20, 25, 27 and 30 ° C, was investigated. The age-specific fecundity function was triangular and oviposition rate (no. of eggs/day) increased with increase in reproductive age of the ladybeetle, attaining a peak then gradually decreasing before finally ceasing. Young adults were more efficient at converting aphid biomass into eggs than older ones. The oviposition peak tended to shift towards younger females and the oviposition rate increased with increase in temperature from 20 to 27 ° C. The maximum fecundity and percent egg viability was 750 eggs and 95 % at 27 ° C and minimum 385 eggs and 65 % at 20 ° C, respectively.

Keywords: ladybeetle, Micraspis discolor, predator, aphids, temperature, fecundity

R•UM•b>

L'influence de la température sur l'évolution de la fécondité de la coccinelle aphidiphage *Micraspis discolor* ^{SP} (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae) se nourrissant sur le puceron du niébé, *Aphis craccivora* ^{SP} Koch (Homoptera: Aphididae) a été étudiée à quatre températures différentes, 20, 25, 27 et 30° C. Le taux d'oviposition (nb d'oeufs/jour) augmente avec l'âge reproducteur de la coccinelle, atteignant un pic puis diminuant progressivement avant de cesser. La conversion de la biomasse des pucerons en oeufs est plus performante chez les jeunes adultes que chez les individus âgés. Le pic d'oviposition s'observe chez les jeunes femelles et le taux d'oviposition augmente avec la température entre 20 et 27° C. La fécondité et le pourcentage d'oeufs viables sont maximum à 27° C avec 750 oeufs et 95% et minimum à 20 ° C avec 385 oeufs et 65%.

Mots Cl• coccinelle, Micraspis discolor, prédateur, pucerons, température, évolution de la fécondité

© Copyright 2002 - ICIPE

FREE PAPERS

SUPPLIERS

FORUM

BULLETIN BOARD

NEWS

BIOLINE MAIL

HOME

powered by **<XML>@CRIA**