Bioline International

JOURNALS

REPORTS

NEWSLETTERS

BOOKS

registration

prices

about

help

Insect Science and its Application

[Search all documents for](#)

Insect Science and its Application, Vol. 21, No. 3, 2001, 225-228

Bioline code: *ti01026*

Price of single document: US\$ 13.00

Bioassay of Insecticidal *Bacillus thuringiensis* ^{SP} Cry IA Delta-Endotoxins against the Spotted Bollworm, *Earias vittella* ^{SP} Fabricius

Gagana Kumar Mahapatro, Gorakh Prasad Gupta and P. Ananda Kumar

ABSTRACT

Insecticidal δ -endotoxins of *Bacillus thuringiensis* ^{SP}, Cry IA (a, b and c) were prepared from over-expressing cells of *Escherichia coli* ^{SP} and bioassayed against the third instars (6-day-old) of the spotted bollworm, *Earias vittella* ^{SP} Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae), using artificial diet. The median lethal concentration (LC50) values were calculated for 6 days of exposure to δ -endotoxins. Cry IA(c) was found to be the most toxic (LC50, 141.2 ng/cm²) followed by Cry IA(a) and Cry IA(b) with LC50 values of 224.5 and 300.5 ng/cm² respectively. A highly significant reduction in larval weight took place in the surviving larvae treated with sub-lethal doses of the insecticidal crystal proteins.

Keywords: *Bacillus thuringiensis*, insecticidal crystal proteins, Cry IA, δ -endotoxins, spotted bollworm, *Earias vittella*

RÉSUMÉ

Les delta-endotoxines insecticides de *Bacillus thuringiensis* ^{SP}, Cry IA

(a, b et c) ont été obtenues à partir de cellules d'*Escherichia coli* ^{SP} ayant un taux d'expression élevé et testées sur des chenilles du 3ème stade (âgées de 6 jours) du ver de la capsule *Earias vittella* ^{SP} Fabricius (Lepidoptera : Noctuidae), élevées sur milieu artificiel. Les valeurs de la dose létale moyenne (DL50) ont été calculées pour 6 jours d'exposition aux delta-endotoxines. Cry IA(c) est la plus toxique (DL 50, 141,2 ng/cm²), suivie de Cry IA(a) et Cry IA(b) avec une DL50 de 224,5 et 300,5 ng/cm² respectivement. Une réduction significative de poids a été constatée chez les chenilles survivantes traitées avec des doses sub-létales des protéines cristallines insecticides.

Mots Clés *Bacillus thuringiensis*, protéines cristallines insecticides, Cry IA, -endotoxines, ver de la capsule, *Earias vittella*

© Copyright 2001 - The International Centre of Insect Physiology and Ecology

[FREE PAPERS](#)

[SUPPLIERS](#)

[FORUM](#)

[BULLETIN BOARD](#)

[NEWS](#)

[BIOLINE MAIL](#)

[HOME](#)

powered by [<XML>@CRIA](#)